

CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE VALAISANNE: DE L'HIVER 1993-94 À L'AUTOMNE 1994

Rapport de la Centrale ornithologique valaisanne

par Bertrand Posse¹

ZUSAMMENFASSUNG

Ornithologische Chronik für das Wallis von Winter 1993-94 bis Herbst 1994

Mit dieser zweiten Ausgabe findet die Chronik ihre auch künftig gültige Form und ihren jährlichen Erscheinungsrhythmus. Sie basiert auf 4'500 in der Datenbank gespeicherten Meldungen. Bei einer Zusammenfassung können nicht alle Beobachtungen einzeln erwähnt werden; deswegen bitten wir alle betroffenen Beobachterinnen und Beobachter um Verständnis dafür, wenn Ihre Meldungen nicht namentlich erscheinen, und hoffen, dass sie trotzdem weiterhin mitarbeiten. Die Zusammenfassung der Beobachtungen ist nur eine Aufgabe der ornithologischen Zentrale; andere Aufgaben sind das Archivieren und das Aufarbeiten der Kenntnisse der Walliser Vogelwelt sowie die Mitarbeit am neuen Brutvogelatlas für die Schweiz. Dabei werden auch alle Informationen verwendet, die Sie in der folgenden Zusammenfassung vermissen.

Die Beringungstätigkeit am Col de Bretolet dauerte vom 8. Juli bis zum 22. Oktober und ergab 9'509 Fänglinge. Das ist die niedrigste Zahl der letzten Jahre (1989-1993 gemittelt: $m = 13'918$). Die dortige tägliche Beobachtung des Greifvogelzuges in den Monaten August und September konnte nicht mehr gewährleistet werden. Deswegen sind die Angaben fragmentarisch und erscheinen in Zukunft nicht mehr gesondert, sondern werden in den allgemeinen Text über den Herbstzug integriert. Neu erscheinen monatliche Zählungen der Wasservögel (Oktober - März), die im Rahmen der Ueberwachung der Ueberwinterungsgebiete von internationaler Bedeutung erstellt werden. Wir beschränken uns dabei auf die Bestände auf Walliser Territorium.

Die Ornithologische Zentrale Wallis hat seit ihrer Gründung vor zwei Jahren die Unterstützung zahlreicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten. Ihnen allen sei an dieser Stelle recht herzlich gedankt. Wir danken auch den Verantwortlichen der anderen Datenbanken, mit denen wir Informationen austauschen: Hans Schmid von der Schweiz. Vogelwarte Sempach, Claire und André Didelot-Vicari und Thierry Schmid von der Centrale Ornithologique Romande, Raphaël Arlettaz von der Bartgeier-Arbeitsgruppe und Olivier Epars für die Wasservogelzählungen am Genfer See. Weiterhin danken wir Markus Leuenberger für die Angaben vom Col de Bretolet, Niklaus Zbinden für die Angaben der avifaunistischen Kommission und Hildegard Messerknecht für die Übersetzung.

¹ Rue du Simplon 11, 1920 Martigny

INTRODUCTION

Deuxième du genre, ce collationnement trouve sa forme définitive et son rythme annuel de parution. Il compile plus de 4'500 données informatisées: la synthèse masque beaucoup d'entre elles, et c'est inévitable. Que les informateurs occasionnels soient indulgents s'ils ne trouvent pas leurs observations et qu'ils ne se découragent pas de collaborer! Une telle synthèse n'est en effet qu'un aspect de cette banque de données: archivage d'informations et documentation fournie sur l'avifaune valaisanne, collaboration au nouvel atlas des oiseaux nicheurs de Suisse sont d'autres points essentiels qui ne peuvent se passer des informations laissées sous silence ci-après.

L'activité de baguement au col de Bretolet a été assurée du 8 juillet au 22 octobre et totalise 9'509 captures: ce résultat est parmi les plus faibles de ces dernières années (moyenne des captures 1989-1993: $m = 13'918$). La permanence du comptage de rapaces n'y est par contre plus assurée quotidiennement en août et septembre: les observations, de ce fait plus fragmentaires, regagnent ainsi le texte général des migrations automnales et ne figurent plus en annexe. Ce chapitre est dorénavant remplacé par les recensements mensuels d'oiseaux d'eau (octobre-mars), réalisés dans le cadre de la surveillance des zones d'hivernage d'importance internationale: seuls ceux effectués sur territoire valaisan y figurent.

Depuis sa création il y a deux ans, la Centrale valaisanne a reçu le soutien de nombreux adeptes, selon leur motivation et leur disponibilité: qu'ils soient tous chaleureusement remerciés pour leur aide. Notre gratitude va également sans retenue aux banques de données collègues avec qui s'opèrent les échanges d'informations, et plus particulièrement à leurs responsables: Hans Schmid pour la Station ornithologique suisse, Claire et André Didelot-Vicari et Thierry Schmid pour la Centrale ornithologique romande, Raphaël Arlettaz pour le Réseau Gypaète Valais et Olivier Epars pour les recensements d'oiseaux d'eau du Haut-Lac Léman. Nous tenons également à saluer Markus Leuenberger pour les données du col de Bretolet, Niklaus Zbinden pour celles de la CAVS et Hildegard Messerknecht pour la traduction des textes en allemand.

Abréviations des noms d'observateurs **Abkürzungen der Beobachternamen**

A: rA = R. Arlettaz — **B:** phB = Ph. Baumann; cB = C. Bottani; Bru = Ph. Bruchez — **C:** gCa = G. Carron; yCr = Y. Crettenand — **D:** gaD = G. Delaloye; mD = M. Desfayes; hDu = H. Duperrex — **E:** mEi = M. Eichenberger — **F:** jeF = J. Fournier — **G:** Gey = Cl. Geyer; tGu = T. Guillaume; Gun = E. Gunzinger — **H:** cHa = Ch. Haag; Hau = R.

Hauri — **I**: rIm = R. Imstepf — **J**: adJ = A. Jordi — **K**: cK = Ch. Keim; Ker = P. Kernen — **L**: Leu = M. Leuenberger; aLu = A. Lugon; rLu = R. Lugon — **M**: paM = P. Marchesi; liM = L. Maumary; pMo = P. Mosimann — **O**: paO = P.-A. Oggier — **P**: beP = B. Posse; jcP = J.-Cl. Praz — **R**: eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey — **S**: Sal = P. Salzgeber; ES = E. Sermet; aSi = A. Sierro; iSi = I. Simonetta; jS = J. Strahm — **T**: rhT = R. & H. Tschanz; jcT = J.-Cl. Tièche — **V**: rV = R. Voisin; bV = B. Volet — **W**: phW = Ph. Werner; tWy = Th. Wyer — **Z**: Zur = St. Zurbruggen.

En plus des personnes citées ci-dessus, plusieurs données proviennent d'ornithologues observant occasionnellement dans le canton: elles seront suivies dans ce cas du nom complet de leur auteur.

Il faut également ajouter d'autres abréviations à la liste présentée plus haut; elles concernent des organismes qui ont aimablement mis à disposition leurs données:

CAvS = Commission de l'avifaune suisse. — G = Réseau Gypaète Valais. — OROEM = recensements d'oiseaux d'eau du Haut-Lac Léman. — S = captures au col de Bretolet, sans mention du nom de l'observateur.

Autres abréviations utilisées dans le texte: ad = adulte; ch = chanteur; env = environ; f = femelle; imm = immature; ind = individu; j ou juv = jeune, juvénile; m = mâle; max = maximum; subad = subadulte.

Zusätzlich zu den oben erwähnten Personen haben uns auch auswärtige, nur gelegentlich im Wallis weilende Beobachter ihre Angaben geschickt: sie sind im Text mit vollem Namen erwähnt.

Weitere Abkürzungen betreffen die Organisationen, die uns freundlicherweise ihre Angaben zur Verfügung gestellt haben:

CAvS = Avifaunistische Kommission der Schweiz. — G = Bartgeier-Arbeitsgruppe. — OROEM = Wasservogelzählung am oberen Genfersee. — S = Fängling am Col de Bretolet, ohne Namensangabe.

Andere Abkürzungen im Text: ad = adult; ch = Sänger; env = ungefähr; f = Weibchen; imm = immatur; ind = Individuum; j oder juv = Jungvogel; m = Männchen; max = maximum; subad = subadult.

L'HIVER 1993-1994 WINTER 1993/1994

Une saison marquée par la **chaleur** et l'**humidité**, en décembre principalement, fournit à la Suisse un bon hivernage de migrants à courte distance. Cette constatation, semble-t-il, ne s'est que peu répercutée sur les espèces hivernant traditionnellement en petit nombre en Valais, comme par exemple le Rougequeue noir, l'Accenteur mouchet ou divers Fringilles. Toutefois, les apparitions conjointes de quelques spécialités ne leur sont probablement pas étrangères: pensons à l'**Alouette lulu**, au **Traquet pâtre**, à la **Grive mauvis** ou encore au **Roitelet triple-bandeau**. Signalons également le premier **hivernage complet du Milan royal** et deux observations de **Bécasse** que nous serions bien tenté de rattacher à ces conditions particulièrement douces. A l'opposé de cette

tendance, les **Alouettes des champs** ont été bien rares, tout comme dans le reste de la Suisse. Enfin, si les effectifs de **Cormorans** semblent en recul sur les lacs suisses, ils atteignent chez nous des **quotas jamais égalés**: réaction face à une réputation montante de mal-aimé sur le Léman ou simple instinct d'exploration?

Ein warmer und feuchter Winter, vor allem im Dezember, bescherte der Schweiz viele Kurzstreckenzieher als Ueberwinterer. Allerdings waren davon weniger diejenigen Arten betroffen, die traditionellerweise in kleiner Zahl im Wallis überwintern wie z.B. Hausrotschwanz, Heckenbraunelle oder verschiedene Finkenvögel. Das gleichzeitige Auftreten einiger spezieller Arten wie z.B. Heidelerche, Schwarzkehlchen, Rotdrossel oder Sommergoldhähnchen schreiben wir diesen Winterbedingungen zu. Ähnlich taxieren wir ferner die erstmalige Ueberwinterung des Rotmilans und zwei Beobachtungen der Waldschnepfe. Im Gegensatz zu diesem Trend waren Feldlerchen eher selten, wie übrigens in der ganzen Schweiz. Neues von der Kormoran-Front: während sein Bestand auf den Schweizer Seen rückläufig zu sein scheint, trat dieser Vogel bei uns in nie erreichter Zahl auf.

Grèbe castagneux, Zwergtaucher: seulement 3 données d'hivernage, à Grône uniquement: 1 à 6 ind entre le 9 et le 27.1 (cB, Rey). — **Grèbe jougris, Rothalstaucher**: 1 ind le 9.1 entre Saint-Gingolph et le Bouveret (OROEM).

Cormoran, Kormoran: une apparition timide en décembre avec une seule mention, le 19 à Saint-Maurice (13 ind; jeF), ne laisse en rien présager l'invasion qui suivra: car c'est véritablement en janvier que les Cormorans prennent confortablement leurs quartiers, et plus particulièrement dans la région de Grône-Granges: 5 ind le 8, 45 le 13 et 50 le 20 (Rey, cB) puis finalement 25 le 27.2 (rIm, beP). Relevons également l'observation exceptionnelle de 40 ind le 20.1 à Gampel (Hau) qui s'ajoutent probablement aux effectifs précédents. Ailleurs, la présence est discrète et occasionnelle: 2 le 6.1 et 1 le 18 à Martigny (beP, yCr), 1 le 2.2 à Riddes (jeF) et 1 le 23.1 à Leuk (Sal).

Héron cendré, Graureiher: les seuls véritables hivernants remarquables, une 10^e, sont cantonnés à Grône en décembre-janvier (cB, Rey); un erratique possible, le 7.1 à Saillon (beP).

Le **Canard chipeau, Schnatterente** séjourne une nouvelle fois à Grône: 1-2 ind entre le 8 et le 18.1 (cB, Rey, iSi). — **Sarcelle d'hiver, Krickente**: comme à l'accoutumée, hivernage à Grône: 5-12 oiseaux visibles en janvier et février (cB, Rey, iSi). — **Harle bièvre, Gänsesäger**: une observation «hors-saison», dans le Haut-Valais de surcroît: 3 oiseaux le 16.1 à Niedergesteln (Ker, Sal).

Milan royal, Rotmilan: une 10^e d'observations d'Evionnaz à Fully attestent le séjour d'un imm entre le 4.12 et le 5.3 au moins (jeF, cK, beP): le premier hivernage complet en amont de Saint-Maurice semble-t-il. A noter encore des attardés ou hivernants probables le 9.12 à Massongex (paM), le 19.12 à Saint-Maurice (jeF) et le 13.1 à Vionnaz (rV): fréquence exceptionnelle! — **Gypaète, Bartgeier**: République 5, lâché en Savoie en 1993, séjourne dans la région de Conthey-Ardon-Chamoson du 27.12 au 20.2 (alS et al, G). D'autres oiseaux non identifiés sont observés sans grand suivi dans les régions de Dorénaz et d'Orsières (G) — Un hiver particulièrement pauvre en **Busards Saint-Martin, Kornweihen**: 1 m le 13.12 à Vionnaz (rV) et 1

- ind le 29.12 à Turtmann (phW). — **Epervier, Sperber**: notamment 1 ind le 27.12 à Riederalp 2080 m (mEi). — **Buse, Mäusebussard**: 13 ind ensemble les 13.12 et 13.1 à Vouvry (rV), fort rassemblement hivernal pour la région.
- Faucon émerillon, Merlin**: une seule donnée, celle du 9.1 à Vionnaz (rV).
- Lagopède, Alpenschneehuhn**: 3 ind relativement bas, le 4.1 près de Bourg-Saint-Pierre 1'850 m (paM).
- Perdrix bartavelle, Steinhuhn**: descend à Saillon, 850 m, le 9.1 (jcP).
- Rôle d'eau, Wasserralle**: présence à Saillon (1 ind; beP) et Grône (1-2 ind; Rey). — **Poule d'eau, Teichhuhn**: faible hivernage à Martigny, Saillon et Grône (beP; Rey, iSi).
- Bécassine des marais, Bekassine**: hivernage probable au bord d'un canal à Martigny: 2 ind les 6-7.1 et 1 le 19.2 (beP). — Deux observations de **Bécasse, Waldschnepfe**: 1 le 4.1 à Martigny (J.-Cl. Tornay) et 1 le 22.1 au-dessus de Saint-Léonard, 760 m (aLu). — **Chevalier culblanc, Waldwasserläufer**: tentative probable d'hivernage à Monthey: 2 ind les 22.11 et 3.12 (rV).
- La Tourterelle turque, Türkentaube** pourrait être sédentaire à Zermatt, 1'650 m: 8 ind le 11.12 (jS).
- Hibou moyen-duc, Waldohreule**: un dortoir de 7 ind est découvert à fin janvier à Saillon (jcP).
- Martin-pêcheur, Eisvogel**: observations isolées à Grône (cB) et Raron (Ker).
- Alouette lulu, Heidelerche**: notée à Niedergesteln, 800 m: 1-2 ind les 3 et 5.1 (rlm), témoins d'un hivernage très rarement remarqué chez nous. — **Alouette des champs, Feldlerche**: seulement une 30^e d'oiseaux en décembre à Vouvry (rV), faible effectif s'inscrivant parfaitement dans la tendance nationale.
- Pipit farlouse, Wiesenpieper**: 2 le 1.2 à Leuk (Rey), seule mention. — **Bergeronnette grise, Bachstelze**: très peu d'hivernage signalé: 12 ind le 6.1 à Martigny (beP) et 1 le 2.2 à Grône (Rey).
- Accenteur mouchet, Heckenbraunelle**: fin décembre et début janvier, des isolés dans les régions de Veyras et Salgesch (Rey). — **Rougequeue noir, Hausrotschwanz**: quatre isolés seulement, le 25.12 à Veyras, le 4.1 à Miège (Rey), le 13.2 à Chamoson (beP) et le 27.2 à Fully (jcP), alors qu'ils sont nombreux dans la moitié nord du pays; un ch le 2.3 à Sion (jcP) est peut-être un hivernant. — **Traquet pâtre, Schwarzkehlchen**: une tentative d'hivernage à Baltschieder: 1 ind les 25.12 et 2.1 (Ker). — **Grive musicienne, Singdrossel**: un groupe de 10 le 9.1 à Saillon (jcP) contraste avec l'absence virtuelle dans le reste du canton. — Deux mentions de **Grive mauvis, Rotdrossel**: 1 ind le 8.1 à Ardon (beP) et 10 ind le 22.1 à Saint-Léonard, 760 m (aLu).
- Pouillot véloce, Zilpzalp**: un erratique probable, le 2.1 à Veyras (Rey). — **Roitelet triple-bandeau, Sommergoldhähnchen**: apparition insolite d'un oiseau le 6.2 à Leuk, 950 m (Rey).
- Crave, Alpenkrähe**: 2 oiseaux descendent sur le bas-coteau près de Brig, 680 m, le 15.1 (mEi). — **Choucas, Dohle**: env 80 ind le 27.1 à Vouvry (rV) et 6 ind le 1.2 à Brig (rlm). — **Le Corbeau freux, Saatkrähe** hiverne dans le Chablais: env 50 le 27.1 à Vouvry (rV).
- Etourneau, Star**: relativement nombreux cet hiver entre Martigny et Granges. A noter 5 ind le 21.1 à Arbaz (cB), 100 le 3.1 à Saillon (jcP) et env 200 le 8.1 à Ardon (beP).
- Moineau domestique, Haussperling**: donnée d'altitude tout à fait respectable pour la saison: 8 ind le 9.12 sur Zermatt, 1'890 m (jS). — **La Niverolle, Schneefink** gagne l'étage montagnard à Arbaz, 1'100 m, les 5 et 13.1 (1-2 ind; cB) et Niedergesteln, 1'190 m, le 13.2 (35 ind; rlm).
- Serin, Girlitz**: seulement 5 observations de janvier (1-4 ind) dans le centre du canton uniquement: Saillon (jcP), Sion (cB), Salgesch et Veyras (Rey). — **Venturon, Zitronenzeisig**: 2 le 28.12 à Vex (Gey) et 5 le 9.1 à Saillon, seules mentions hivernales.

— **Chardonneret, Distelfink**: hivernants très disséminés à Martigny, Saillon, Vétroz et Veyras (beP; jcP; Rey). — **Linotte, Hänfling**: de rares rencontres à Martigny-Fully: 15 le 19.12 puis 2 le 28.2 (beP). — **Sizerin, Birkenzeisig**: notamment une 50^e le 8.1 à Sion (beP). — **Grosbec, Kernbeisser**: quelques mentions d'altitude: 1-2 du 25.12 au 8.1 à Vex (Gey), 1 le 5.1 à Arbaz, 1'100 m (cB), 2 en janvier-février à Icogne, 1'180 m (iSi) et Leuk, 950 m (Rey).

Bruant jaune, Goldammer: seulement 5 données, relatives à Saillon, Icogne et Leuk (jcP; iSi; Rey). — **Bruant zizi, Zaunammer**: 2 le 25.2 à Leuk, 950 m (Rey). — **Bruant fou, Zippammer**: vu à Vernayaz (jeF), Saillon (jcP), Sion (cB), Saint-Léonard (paM) et région sierroise (aLu, Rey); une 20^e d'hivernants à Niedergesteln (rIm). Bon hivernage.

LE PRINTEMPS ET L'ÉTÉ 1994 FRÜHJAHR UND SOMMER 1994

Ce mois de **mars fut l'un des plus chauds enregistrés**, dépassant la moyenne de 5°C env, ce qui se traduit par plusieurs **retours hâtifs** pour quelques arrivants: Chevalier sylvain, Torcol, Hirondelle de rivage. **Avril** suit avec ses 15 premiers jours d'intempéries, marquées essentiellement par d'**abondantes chutes de neige en montagne**. Elles ont retardé l'arrivée de plusieurs passereaux, ont précipité de nombreux migrateurs en plaine et en ont contraint d'autres à l'escalade forcée: c'est ce qui nous explique probablement l'**impressionnant passage de Courlis corlieux**. Mai, enfin plus ensoleillé et plus chaud, se distingue pour sa part par de fortes précipitations les 18 et 19, causant des inondations en plusieurs endroits de Suisse.

Dans ce chapitre, quelques rapaces méritent d'être à l'honneur: le **Gypaète** notamment, avec la visite d'un messenger du Mercantour; le **Circaète** également, fidèle une fois encore à ses quartiers valaisans, et nos trois espèces de **Busards**, qui ont largement visité le canton ce printemps. Terminons ce préambule en signalant une observation d'un tout autre ordre et qui a su créer la surprise: un **Bruant à calotte blanche**, espèce d'origine sibérienne, a chanté durant quelques jours de juillet dans les landes alpines, imitation de ses habitats originaux!

Der Monat März war einer der wärmsten seit Messbeginn. Die mittlere Temperatur lag ungefähr 5°C höher als normal. Die Folge war das frühe Eintreffen mehrerer Arten: Bruchwasserläufer, Wendehals, Uferschwalbe. Die ersten zwei Aprilwochen mit Schlechtwetter brachten vor allem starke Schneefälle in den Bergen. Diese verzögerten die Ankunft einiger Singvogelarten, drückten viele Zugvögel ins Tal und zwangen andere zu einem längeren Aufenthalt. So erklärt sich wahrscheinlich der starke Zug des Regenbrachvogels. Der Monat Mai, insgesamt sonniger und wärmer, brachte am 18./19. starke Regenfälle mit Ueberschwemmungen in vielen Gebieten der Schweiz.

*In diesem Kapitel sollten wir auch einigen Greifvögeln die Ehre geben, vor allem dem **Bartgeier**, der von seinen Höhen zu uns herabkam. Der **Schlangennadler** hielt seinen Walliser Standorten die Treue, und alle drei **Weihenarten** besuchten unseren Kanton in diesem Frühjahr häufig. Zum Schluss noch eine Beobachtung ganz anderer Art, die allgemein für Ueberraschung sorgte: eine **Fichtenammer**, eine Art, die in Sibirien vorkommt, sang während mehrerer Tage im Juli, und zwar in einer Zwergstrauchgesellschaft der subalpinen Stufe, die ihrer Heimat sehr ähnlich ist.*

Grèbe huppé, Haubentaucher: le passage commence normalement en février mais s'achève bien tôt: 3 le 11 à Granges (Rey), puis le 13 à Châteauneuf (yCr), le 27 à Granges et Sion (rIm, beP), le 5.3 à Collombey-Muraz, le 9 à Monthey (jeF) et le 12 à Raron (rIm). Au total: 13 ind.

Cormoran, Kormoran: il est une fois de plus difficile de séparer les hivernants ou éclairés lémaniques des véritables migrateurs, notamment à Grône. Toutefois, l'importance de la présence en ce lieu diminue quelque peu en mars pour se stabiliser à 12-20 oiseaux entre le 17.3 et le 10.4 (aLu, cB, jcT, yCr); les derniers, 5 ind, sont vus le 26.4 (cB, Hau). Ailleurs, présence faible et décousue: au coude du Rhône, jusqu'au 1.4 (beP), à Châteauneuf, les 13.3 et 2.4 (yCr) et à Turtmann le 24.4 (Ker).

Blongios, Zwergreiher: 1 f en escale au bord d'un canal le 23.5 à Martigny (beP), seule observation de migrateur. — **Bihoreau, Nachtreiher:** bon passage, mais très tardif: premiers le 12.5 à Grône (4 ind; cB) et Leuk (2 ind; tGu), maximum de 7 le 15.5 à Leuk (rIm, beP) et dernier le 24.6 au même endroit (Rey). Total minimal de 24 ind. — **Crabier, Rallenreiher:** 1 ind le 20.5 à Grône (M. Wicky). — **Aigrette garzette, Seidenreiher:** apparitions timides, comme partout en Suisse: 3 isolées les 23.4 à Leuk (cB, beP), les 26-30.4 à Grône (Hau, aLu) et le 20.5 à Sion (yCr). — **Héron cendré, Graureiher:** entre autres 1 migrateur le 30.3 à Morgins, l'400 m (rV) et 2 ind remontant isolément la vallée le 7.7 à Geschinen (beP). — Bon passage du **Héron pourpré, Purpureiher:** 13 observations réparties en 3 localités (Martigny, Grône et Leuk), entre le 20.4 et le 11.6 (cB, gaD, beP, D. Legler *et al*).

Cigogne blanche, Weissstorch: deux migrateurs dans les temps, le 3.4 à Monthey (rV) et le 6 en vol à Fully (ES), puis 1 erratique le 8.6 à Leuk (U. Kägi).

Le **Canard siffleur, Pfeifente** ne fréquente que les étangs de Leuk: 1 oiseau les 29.3, 13 et 15.4 (beP, Rey, jcT). — **Sarcelle d'hiver, Krickente:** premiers mouvements décelables le 9.3 à Leuk (2 ind; aLu); le passage est visible en 3 localités, dont celle de Steg (5 ind le 20.3; rIm), et ne laisse pas d'attardées: dernières le 22.4 à Grône (aSi). — **Canard pilet, Spiessente:** à Grône uniquement: 2 ind les 5 et 14.3 (Rey). — **Sarcelle d'été, Knäkente:** faible passage tardif, tout comme dans le reste du pays: 3 le 30.3 à Grône (Rey), puis 2-1 les 13-14.4 à Martigny (tGu, beP, cK) et une attardée les 8-10.5 à Leuk (C. Schönbächler; Rey). — **Canard souchet, Löffelente:** 5 le 20.3 à Steg (rIm, Ker) ouvrent un bon passage (total minimal: 17 ind), à Martigny, Grône et Leuk (tGu, cK, beP, Rey), s'étendant jusqu'au 23.4 (cB). — **Fuligule milouin, Tafelente:** au moins 1 le 12.3 à Raron (rIm) et 2 du 12 au 19.4 à Grône (Rey, aLu *et al*). — **Garrot à œil d'or, Schellente:** 1 oiseau en vol sur le Rhône à Massongex (mD) pour la 4^e fois hors Léman: une observation tous les 10 ans environ. — **Harle bièvre, Gänsesäger:** premiers mouvements le 18.2 à Saint-Maurice où 6 observations s'échelonnent jusqu'au 7.5 (beP, jeF, paM). Dans cette fourchette, les données proviennent de Vouvry (max 13 ind le 15.3; rV), Collombey, Monthey, Dorénaz, Martigny, Riddes et Leuk (div obs).

Bondrée, Wespenbussard: première dans les temps, le 8.5 à Leuk (beP, C. Schönbächler); escapade estivale observée le 29.6 au-dessus de Leukerbad, 2'500 m (Gun). — **Milan noir, Schwarzmilan:** premier le 13.3 à Dorénaz (rA), sans surprise. — **Milan royal, Rotmilan:** passage principal entre le 23.3 et le 7.4 (6 ind) puis comme d'habitude quelques isolés à fin avril et en mai: les 19.4 et 3.5 à Nendaz, le 21.4 à Châteauneuf (yCr), le 10.5 à Salgesch (paM) et le 11 à Vouvry (rV). — Une fois n'est pas coutume pour un **Gypaète, Bartgeier**, Argentera, juv du Mercantour lâché en 1993, fréquente le Haut-Valais: Leukerbad, Varen et probablement Gampel entre le 28.3 et le 16.6 (div. obs. G); République 5, quant à lui, réapparaît dans le Massif des Dents de Morcles les 23-24.7 et 15.8 (G). A relever également des adultes observés le 27.5 à Chamoson (A. Udry), le 20.7 à Vouvry (J.-P. Guex), le 1.8 à Champéry (Cl. Deschenaux) et le 11.8 à Conthey (A. Udry). Enfin, 11 autres données étoffent la saison, sans que les oiseaux aient pu être déterminés avec certitude: Liddes, Bourg-Saint-Pierre, Fully, Leytron, Conthey, Ausserberg, Oberwald (G). — **Circaète, Schlangenadler:** les récentes traditions d'abondance se perpétuent: 29 observations concernent des migrateurs ou des estivants! Du 6 au 18.4, voire même jusqu'au 6.5, 1 ind fréquente les marais de Grône (jcT, yCr, beP, iSi, rIm): il est différent de celui de Saint-Léonard des 3 et 5.5 (cB); 1 ind le 14.4 à Sierre (tGu, liM). Entre Leuk et Raron, présence régulière du 16.4 au 28.7 (tGu, rIm, Rey *et al*). A Fully, 1 ind le 2.6 et à début août (Ch. Monnerat, St. Mettaz); enfin, dans la région de Champéry, un ind est vu à trois reprises en été (E. Huttenmoser, par P. Oggier), probablement la phase claire qui est observée le 2.8 passant la nuit dans une forêt de conifères sous le village (alS). — **Busard des roseaux, Rohrweihe:** très bon passage du 5.4 au 21.5 (38 observations), la majorité à Grône et Leuk. Ailleurs, des ind isolés le 12.5 à Saint-Léonard, 14.5 à Martigny (beP), le 15.5 à Niedergesteln (cB) et un attardé insolite le 3.6 à Ulrichen, 1'400 m (pMo). — **Busard Saint-Martin, Kornweihe:** 14 données réparties entre Vouvry, Martigny, Leuk, Turtmann, Steg et Niedergesteln, la dernière le 24.4 dans la région de Leuk-Turtmann (Sal, Ker). — Bon passage du **Busard cendré, Wiesenweihe** dans le Haut-Valais uniquement: à Leuk, les 30.4, 7-8-10, 21 et 27.5 (tGu, jeF, Rey *et al*), à Gampel, les 28-29.5 (rIm) et à Raron, les 21-25.5 (rIm, F. Sigg). — **Epervier, Sperber:** 1 m en excursion le 19.8 au sommet de la Dent de Morcles, 3'000 m (beP).

Balbuzzard, Fischadler: 1 le 9.4 à Niedergesteln (rIm) et 1 le 23.4 à Grône (Rey).

Faucon crécerelle, Turmfalke: 6 migrateurs le 6.4 à Collombey-Muraz (rV). — **Faucon kobez, Rotfussfalke:** à Leuk, 3 le 14.5 et et 2 le 22 (tGu, liM; Rey) et 1 f du 19 au 22.5 à Martigny (cK, beP, tGu, hDu). — **Faucon hobereau, Baumfalke:** à Vionnaz seulement, les 1^{er} et 25.5 (rV).

Lagopède, Alpenschneehuhn: observé jusqu'à 3'100 m, le 9.8 sur Saas-Grund (cHa).

Echasse, Stelzenläufer: 1 ind en courte escale le 15.4 à Leuk (beP). — **Petit Gravelot, Flussregenpfeifer:** petit passage, avec 2 premiers le 27.3 à Salgesch (Rey) qui s'installent, puis 3 le 8.4 à Martigny (beP), 2-3 du 10 au 30.4 à Grône (Rey, aLu, cB, cK, beP) et 1 dernier le 23.5 à Leuk (rIm). — **Vanneau, Kiebitz:** arrivée très hâtive, le 1.2 à Vionnaz (rV), puis faible passage du 3.3 à Leuk (30 ind; Rey) au 8.4 à Martigny (beP). Environ 80 ind au total.

Combattant, Kampfläufer: très faible passage: à Vouvry le 14.3 (liM) et à Ausserberg le 1.5 (Sal). — **Bécassine des marais, Bekassine:** le déclin se confirme: 7 données printanières pour tout le canton: les 5.3, 14, 21 et 6.4 à Grône (Rey, yCr, jcT), le 21.3 à Martigny (beP) et 3-5 ind les 14-17.4 à Vionnaz (rV)! Faible passage constaté au niveau national également. — **Courlis corlieu, Regenbrachvogel:** un important passage en Suisse appuie les observations spectaculaires de ce printemps dans notre canton: des 12 ind dans la région de Leuk-Turtmann le 9.4 (phW), il en reste 4 puis

- 2 entre le 10 et le 16.4 à Leuk (P. Oggier, Rey, liM, beP, iSi). A noter également 1 ind le 5.4 à Ardon (gaD). Pour situer l'ampleur du phénomène, il peut être bon de rappeler que l'espèce n'a été signalée que 10 fois dans le canton jusqu'à présent, et uniquement de manière isolée! — **Chevalier arlequin, *Dunkler Wasserläufer***: 1 le 10.4 à Grône (cB, yCr). — **Chevalier aboyeur, *Grünschenkel***: 1 les 10 et 18.4 à Grône (yCr; aLu, Rey) et le 15.5 à Leuk (rIm). — **Chevalier culblanc, *Waldwasserläufer***: 21 mentions entre le 25.3 (rLu) et le 28.4 (Rey) à Martigny, Grône et Leuk; max de 4 ind du 19 au 22.4 à Grône (aLu, aSi, iSi). — **Chevalier sylvain, *Bruchwasserläufer***: 1 ind hâtif le 27.3 à Grône (aLu, O. Roy), homologué CAvS, suivi d'isolés le 30.4 à Grône et Leuk (aLu; jeF) et de 8 ind le 8.5 à Leuk (P. Oggier). — **Chevalier guignette, *Flussuferläufer***: un premier hors date, le 23.3 à Martigny (beP). Le passage printanier, court et discret comme a son habitude, dure du 25.4 (Rey) au 14.5 (tGu, jeF).
- Mouette rieuse, *Lachmöwe***: les plus grandes troupes, 26 ind le 22.4 et 27 le 12.5 à Grône (cB); à noter 5 migratrices le 20.3 à Raron (rIm). — **Goéland leucopnée, *Weisskopfmöwe***: 1 ind le 7.4 à Conthey (jeF).
- Deux **Guifettes moustacs, *Weissbartseeschwalben***, le 20.4 à Grône (cB). — **Guifette noire, *Trauerseeschwalbe***: passage rare par son abondance, en opposition avec les observations nationales: 7 ind le 15.5 à Niedergesteln (cB) puis 10 le 19.5 à Sion et 3 le 20 à Châteauneuf (yCr).
- Pigeon biset domestique, *Haustaube***: 1 oiseau en balade le 3.7 sur Zermatt, 2'200 m (jS). — **Pigeon colombin, *Hohltaube***: vu à Martigny, le 27.2 (beP), et à Vouvry: max de 12 le 13.3 et dernier le 17.4 (rV). — **Tourterelle turque, *Türkentaube***: regroupement d'au moins une 100^e d'oiseaux le 6.4 dans un champ puriné à Sion (aLu). — **Tourterelle des bois, *Turteltaube***: 2 ind extrêmement hâtifs le 3.4 à Monthey (rV).
- Hibou des marais, *Sumpfohreule***: 1 le 21.5 à Raron (rIm).
- Martinet noir, *Mauersegler***: premiers très hâtifs le 1.4 à Vouvry (beP), puis les 6 et 11.4 à Grône (jcT) où une 50^e apparaissent déjà le 22.4 (aSi). — **Martinet à ventre blanc, *Alpensegler***: premier le 3.4 à Monthey (rV), le 5 à Grône (Rey) et déjà 10 le lendemain (jcT).
- Martin-pêcheur, *Eisvogel***: 5 observations de migrateurs à Dorénaz (cK), Sion (yCr) et Leuk (Rey).
Passage fugace du **Guêpier, *Bienenfresser***: une 15^e au moins le 13.5 à Martigny-Combe, 760 m (mD) et 3 le 15.5 à Leuk (rIm).
- Huppe, *Wiedehopf***: première le 26.3 à Gampel (rIm), puis le 31 à Vernayaz (J. Pasche, par jeF).
- Torcol, *Wendehals***: premier hâtif le 23.3 à Sion (yCr), suivi en deux points dès le 27: Grône (O. Roy, aLu) et Bitsch (rIm). — **Pic épeichette, *Kleinspecht***: 1 ch d'un jour, le 22.3 en plaine de Martigny (beP).
- Alouette calandrelle, *Kurzzeihenlerche***: 2 ind le 30.4 (tGu) et 1 le 14.5 (tGu, hDu, liM, L. Vallotton, Y. Ottesen) à Leuk, toutes homologuées CAvS.
- Hirondelle de rivage, *Uferschwalbe***: 2 premières exceptionnellement hâtives le 7.3 à Icogne (iSi) suivies d'un passage normal dès le 7.4 (Collombey-Muraz; beP). — **Hirondelle de rochers, *Felsenschwalbe***: une 20^e le 26.2 à Ausserberg (Ker) laissent présager une arrivée antérieure. — **Hirondelle rustique, *Rauchschwalbe***: 2 premières ordinaires le 21.3 à Fully (beP). — **Hirondelle de fenêtre, *Mehlschwalbe***: les premières arrivées tardent un peu: 1 le 13.4 à Grône (jcT).
- Pipit rousseline, *Brachpieper***: passage sur un mois, entre le 15.4 et le 15.5 à Leuk principalement et Martigny (beP, rIm et al): max de 5 le 24.4 à Leuk (Zur). — **Pipit des arbres, *Baumpieper***: premiers tardifs le 13.4 à Martigny (beP).

- **Bergeronnette printanière, Schafstelze**: premières le 30.3 à Grône (Rey). Passage diffus: max de 50 le 16.4 à Martigny (cK), mais à noter tout de même 2 m de la sp *feldegg*, le 7.5 à Martigny (beP; homologués CAVS).
- Rossignol, Nachtigall**: dès le 24.4 en plusieurs points: Grône (Rey), Ausserberg (Ker) et Raron (Sal). — **Rougequeue noir, Hausrötel**: premier le 6.3 à Martigny-Combe (beP). — **Rougequeue à front blanc, Gatenrötel**: premier le 15.4 à Leuk (beP). — **Traquet tavier, Braunkehlchen**: premier pas avant le 20.4, à Grône (aLu). — **Traquet pâtre, Schwarzehlchen**: premier le 27.2 à Martigny (beP) et Steg (Sal). — **Traquet motteux, Steinschmützer**: premier le 29.3 à Leuk (Rey). Le 5.6, des chutes de neige contraignent des nicheurs locaux à regagner temporairement la plaine: 6 à Leuk, 1 à Turtmann et Gampel (beP, M. Käppeli). — **Merle à plastron, Ringamsel**: le mauvais temps amène quelques migrants de plaine: le 4.4 à Veyras, le 7 à Niedergesteln (rlm), le 8 à Châteauneuf (yCr), le 10 à Sion (aSi), le 15 à Leuk (Rey). — **Merle, Amsel**: premier chant le 3.1 déjà à Veyras (Rey). — **Grive mauvis, Rotdrossel**: des isolées les 23 et 27.3 à Martigny-Combe (Bru, eRe, beP).
- Locustelle tachetée, Feldschwirl**: 10 observations entre le 22.4 (Sierre; aSi) et le 29.5 (Martigny; beP), dont une le 8.5 à Lourtier/Bagnes, 990 m (rLu). — **Phragmite des joncs, Schilfrohrsänger**: 1 le 8.5 à Leuk (C. Schönbächler, beP). — **Rousserolle turdoïde, Drosselrohrsänger**: arrivée le 29.4 à Grône (aLu, Rey). — **Hypolaïs icterine, Gelbspötter**: 1 seul migrant signalé, le 31.5 à Sierre (aSi). — **Fauvette orphée, Orpheusgrasmücke**: observation hâtive d'une migratrice probablement, le 21.4 à Lalden (tWy). — **Fauvette babillarde, Klappergrasmücke**: le 15.4 à Martigny (beP) puis le 17 à Niedergesteln (rlm). — **Fauvette à tête noire, Mönchsgrasmücke**: première le 8.3 à Sion (jcP). — **Pouillot siffleur, Waldlaubsänger**: dernier le 23.5 à Saillon (bV). — **Pouillot fitis, Fitis**: arrive à fin mars, dès le 26 à Niedergesteln (rlm).
- Mésange boréale, Mönchmeise**: constatée en plaine, à Grône, le 6.4, durant la période des fortes chutes de neige (jcT).




Fig. Observation de la Corneille mantelée et des hybrides Corneille mantelée x Corneille noire en Valais en 1994. N=29.

Mésange rémiz, Beutelmeise: des isolées à Grône, les 17.3 et 6.4 (aLu): petit passage.
Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: première le 29.4 à Ausserberg (Ker); passage marqué dès le 7.5.

Crave, Alpenkrähe: notamment 4-7 oiseaux en plaine de Leuk, 620 m, le 15.4 (Rey, jcT, beP), présence due aux chutes de neige. — **Choucas, Dohle:** retour probable le 14.2 à Saint-Maurice (13 ind; jeF), suivi de 10 ind le 12.3 à Raron (rlm), 4 le 13.3 à Dorénaz et Vouvry (beP), 2 le 20 à Steg (rlm) et 1 le 15.4 en ville de Sion (aLu). — **Corbeau freux, Saatkrähe:** 2 observations de migrateurs: 6 ind le 13.3 à Dorénaz et 1 le 21.3 à Martigny (beP). — **Corneille mantelée, Nebelkrähe:** voir la carte pour la répartition des observationsci-dessous.

Moineau cisalpin, Italiensperling: signalé dans les régions de Leuk et Gampel (tGu, Rey; beP). A noter 1 ind le 23.7 sur Chamoson, 1'310 m (J.-P. Reitz). — **Niverolle, Schneefink:** un oiseau dans la plaine enneigée de Martigny, le 9.4 (beP).

Pinson du Nord, Bergfink: dernier attardé le 9.4 à Ardon (gaD). — **Venturon, Zitronenzeisig:** en plaine, le 16.3 à Finges (Rey), les 15 et 19.4 à Leuk (jcT, Rey). — **Linotte, Hänfling:** premières le 6.3 à Martigny (beP).

Bruant à calotte blanche, Fichtenammer: découverte très inattendue d'un m ch solitaire non bagué, du 12 au 18.7 au-dessus de Saxon, 2'150 m (F. Brehm, beP, bV, gCa, gaD, hDu); homologué CAVS comme possible échappé de captivité. — **Bruant ortolan, Ortolan:** premier le 23.4 à Martigny (tGu) et le 26 à Raron (Sal). — **Bruant proyer, Grauammer:** premiers hâtifs le 20.2 à Turtmann (rlm) puis quelques migrants à Vouvry, Martigny (beP) et Niedergesteln (rlm).

INDICES DE NIDIFICATION EN 1994 BRUTNACHWEISE 1994

La saison fut riche en surprises et en longs espoirs récompensés: elle marque en effet les **premières nidifications** certaines du **Canard souchet**, de la **Nette rousse** et du **Faucon hobereau**! Le chant du **Râle des genêts** s'est quant à lui à nouveau fait entendre dans la vallée du Rhône, mais ce retour ne doit cependant pas nous leurrer sur son sort...

Au chapitre des tendances annuelles, le Traquet pâtre et le Bruant proyer ont montré des effectifs réjouissants au niveau national, évolution ma fois très mal remarquée chez nous.

*Es gab mehrere Ueberraschungen, und einige langgehegte Hoffnungen wurden erfüllt: die **ersten sicheren Brutnachweise** für die **Löffelente**, die **Kolbenente** und den **Baumfalken** wurden erbracht. Der **Wachtelkönig** hat wieder im Rottental gerufen — dies darf jedoch kein Anlass zu falschen Hoffnungen für seine Zukunft sein.*

Währenddem Schwarzkehlchen und Grauammer auf nationaler Ebene recht erfreuliche Bestände aufgewiesen haben, war dies im Wallis leider nicht so.

Grèbe castagneux, Zwergtaucher: au moins 6 familles à Grône le 10.8; une nichée tardive à Martigny avec 7 juv le 14.8 (Bru, beP).

Blongios, Zwergreiher: nidification certaine à Leuk: nourrissage observé le 8.7 (beP), ainsi qu'à Grône: une f et un juv observés le 10.8, alors que la présence de l'espèce

- est constatée depuis le 1.6 (Hau, iSi, Rey, phW *et al.*). — **Héron cendré, Graureiher**: présence en période de nidification à Martigny et Grône, une nouvelle fois sans autre indice (beP, iSi, jcT).
- Canard colvert, Stockente**: à signaler une nidification hâtive à Grône: 1 f avec 12 poussins le 13.4 (jcT); il en restait 7 le 15 et 6 le 18 (cB, aLu); 3 c mentionnés à Derborence en mai (jcP). — **Canard souchet, Löffelente**: nidification à Grône, la première pour notre canton: le 28.7, 1 f est accompagnée d'un juv presque aussi grand qu'elle, mais avec le bec et les ailes encore incomplètement développés (Hau). Le 10.8, le m est également observé: le juv à la taille adulte, mais le bec encore plus étroit (Bru, beP). L'espèce n'avait plus niché en Suisse depuis 1987. — **Fuligule morillon, Reiherente**: env 5 familles au Bouveret (J.-M. Fivat, J.-P. Gaillard, rhT).
- Milan noir, Schwarzmilan**: observé en mai et juin à nouveau jusqu'à Gampel (rIm, U. Kägi).
- Faucon hobereau, Baumfalke**: une première preuve de nidification, attendue depuis bien longtemps: un c à Collombey-Muraz donne 2 juv à l'envol vers le 20.8 (ES, rV). Jusqu'à présent, moins d'une dizaine d'observations de juin ou de juillet laissent présumer des reproductions possibles dans le Valais central ou le Haut-Valais. — **Faucon pèlerin, Wanderfalke**: un nouveau c semble cantonné dans la vallée de Bagnes (rLu).
- Caille, Wachtel**: dans la plaine du Rhône, hors secteur allant de Leuk à Ausserberg, une série de données proviennent de Brig-Glis en mai-juin (mEi) et une seule de ch du Valais romand, le 20.5 à Sion (aLu). Dans les vallées latérales, notée le 12.6 à Münster et Obergesteln (D. Legler), le 15.6 à Zeneggen l'390 m (H. Weber) et le 13.7 sur Evolène, l'600 m (aLS). En tout, 15 à 20 ch.
- Rôle d'eau, Wasserralle**: 2-3 c nicheur à Vionnaz (ES) et des indices à Grône (jcT) et Leuk (beP, U. Kägi). — Retour étonnant du **Rôle des genêts, Wachtelkönig** après deux décennies d'absence: 2 ch durant deux semaines de juin à Niedergesteln (A. Cotty).
- Petit Gravelot, Flussregenpfeifer**: 3 territoires occupés à fin avril et 1 supplémentaire en juin dans la zone alluviale de Finges (aLu, aSi, jeF, J.-M. Fivat, D. Legler); 1 c nicheur à Sion (phW) et 1 à Bramois (paO, par aLu). — **Vanneau, Kiebitz**: à Vionnaz, les intempéries du printemps semblent avoir été favorables à la reproduction: les sols gorgés d'eau ont retardé les labours. 3 c au moins ont eu des poussins (ES), alors que 14 territoires étaient défendus le 1.4 (beP). A Vouvry, de telles précisions manquent: 4 territoires défendus le 1.4 (beP) puis 3 ind observés le 2.5 (tGu).
- Bécasse, Waldschnepfe**: 3 aires de croules signalées sur Collombey-Muraz (paM, tGu), deux dans le Val d'Illiez (aLS; A. Bassin, A. Gerber), en plus des désormais traditionnelles du col des Planches (jeF) et du Bois de Finges (B. Schelbert, D. Legler). — **Chevalier guignette, Flussuferläufer**: 3 territoires signalés dans le périmètre du Bois de Finges (aLu, D. Legler, U. Kägi *et al.*) et une nidification certaine à Biel, Goms (Zur); un oiseau présent à fin mai à Birgisch (mEi) est peut-être un migrateur.
- Tourterelle turque, Türkentaube**: connue depuis longtemps maintenant, la petite population de Zermatt totalise 13 ind le 10.5: les oiseaux se ravitaillent dans un poulailler (jS). En revanche, la colonisatoine semble-t-il récente au Châble, 840 m, où un couple est observé en mai (rLu). — **Tourterelle des bois, Turteltaube**: quelques observations suspectes de mai ou de début juin traduisent peut-être du passage. Toutefois, des indices plus sérieux proviennent de Vionnaz (ES), Ardon (aLu) et Salgesch (paM).
- Effraie, Schleiereule**: présence estivale constatée à Martigny, sans nidification toutefois (Ch. Troillet).
- Petit-duc, Zwergohreule**: bilan d'une disparition annoncée: 2 œufs non incubés dans

un nichoir à Vex le 11.7 et ponte de 5 œufs abandonnés le 13 à Ayent (aLu). — **Grand-duc, Uhu:** nidification certaine en 3 sites de bas-coteau (rA, aLu *et al*). — **Chouette hulotte, Waldkauz:** nidification régulière depuis au moins 10 ans en un site élevé du Val d'Illicz, l'680 m: ad et juv le 21.6 (aLS). — **Hibou moyen-duc, Waldohreule:** très peu d'indices, dont seulement un de plaine: 1 ind le 5.4 en ville de Martigny (Bru), 1 ch le 24.3 sur Raron, l'270 m (rIm), une famille en août sur Saint-Martin, 2'200 m (jcP), et 1 imm alarmant le 7.9 à Leuk (aLu). — **Chouette de Tengmalm, Rauhfusskauz:** ch le plus élevé, le 26.4 sur Gampel, 2'230 (M. Weggler).

Engoulevent, Nachtschwalbe: surtout signalé dans le Haut-Valais, avec toutefois un nouveau site sur rive gauche en Valais central (yCr). A noter également un ind le 21.8 à Sion (aLu): migrateur?

Martinet à ventre blanc, Alpensegler: notamment, une petite colonie signalée à Savièse (rIm).

Martin-pêcheur, Eisvogel: le 20.4 à Leuk (Rey), peut-être un migrateur attardé, mais seul indice.

Guêpier, Bienenfresser: les nicheurs du Haut-Valais nous sont revenus en effectifs réduits: présence mentionnée dès le 30.4 à la colonie, où 3 ad sont régulièrement observés dès le 27.5; ils élèvent 4 jeunes au moins (rIm, beP, Sal *et al*).

Huppe, Wiedehopf: bien répandue dans le Haut-Valais (15 localités) jusqu'à Bitsch puis, dans le Centre, signalée à Fully (beP), Icogne (L. Gloor), Arbaz (tGu, aLu), Bramois (aLu), Saint-Léonard (cB, Rey, aSi) et Sierre l'200 m (Rey). A noter deux indices insolites de migrateurs tentant peut-être de s'installer: ch quelques jours en avril à Evolène, l'400 m (B. Chevrier) et à début mai à Bruson (transmis par rLu). Les mentions les plus élevées concernent Zeneggen l'320 m (1 ad nourrit 2 juv; H. Weber) et Erschmatt, l'600 m (phW).

Torcol, Wendehals: notamment 1 ch sur Albinen, 2'100 m le 14.6 (R. Spaar): très haut! — **Pic vert, Grünspecht:** les mentions de plaine ne concernent plus que Vionnaz, Martigny et Grône. A l'opposé, vu jusqu'à 2'300 m à Zermatt, où il semble nicher (jS). — **Pic épechette, Kleinspecht:** semble bien répandu en amont de Vernayaz. Dans le Chablais, signalé à Vouvy et Vionnaz (rV; jcT). Des indices de nidifications probables concernaient la vallée de Conches depuis quelques années: le 23.6, 1 f nourrit dans le Fieschertal à l'340 m (E. Baader), ce qui constitue la preuve de nidification certaine la plus élevée pour la Suisse.

Alouette lulu, Heidelerche: aucun indice en aval de Sierre. A noter un ch le 22.5 sur Niedergesteln, l'820 m (rIm). — **Alouette des champs, Feldlerche:** des mentions exceptionnellement élevées à Zermatt où des ch sont entendus à 2'600 et 2'700 m (jS).

Hirondelle de rochers, Felsenschwalbe: un nid posé sur une poutre d'un chalet de bois en mai à Lourtier/Bagnes (rLu). 1-2 nidifications à 2'300 m sur Zermatt (jcT). — **Hirondelle de fenêtre, Mehlschwalbe:** à nouveau des nichées tardives à Zermatt où des nourrissages sont encore observés le 22.9 (jS).

Pipit rousseline, Brachpieper: un ch en juin près de Leuk (U. Kägi). — **Pipit des arbres, Baumpieper:** un ch en plaine le 20.5 à Salgesch (paM), une relique! — **Berge-ronnette printanière, Schafstelze:** un couple alarmant le 1.8 à Vouvy (ES), puis indices de nidification à Leuk, Turtmann, Gampel, Raron et Baltschieder. Au total: 8 couples au moins installés cette année. — **Berge-ronnette grise, Bachstelze:** Zermatt se distingue une fois encore: comme chaque année, un couple sur un restaurant à 2'580 m (jS)!

Cincle, Wasseramsel: de très hautes altitudes traduisent peut-être un erratisme estival: 1 c le 12.6 à 2'100 m sur Zermatt (jcT) et 1 ind le 2.7 à 2'150 m sur Evolène (M. Thélin).

Accenteur mouchet, Heckenbraunelle: 3 ch le 8.7 entre 2'300 et 2'500 m sur Hérémence (Gey) semblent constituer des records d'altitude pour la Suisse. — **Accenteur alpin, Alpenbraunelle:** nidifications certaines constatées jusqu'à 3'100 m près de Zermatt: 5 c le 21.7, parfois avec des juv (jcT).

Rougequeue noir, Hausrotschwanz: des ad nourrissent le 19.7 sur Saas Fee, 2'870 m (G. Oesterheld). — **Rougequeue à front blanc, Gartenrotschwanz:** signalé en amont de Martigny uniquement. — **Traquet tarier, Braunkehlchen:** l'un des derniers c de la plaine bas-valaisanne est noté à Vionnaz en mai (ES, rV). Indices les plus élevés, des familles le 14.7 sur Evolène, 2'200 m (Gey) et 15 sur Hérémence, 2'200 m également (jeF). — **Traquet pâte, Schwarzkehlchen:** état de santé bien précaire dans la partie romande du canton, à l'opposé de la tendance helvétique de cette année: 3 ch au moins dans la région de Collombey-Muraz (ES, rV), nidification possible à Dorénaz et seulement 2 certaines à Martigny (beP, rA) puis 1 ou 2 possibles près de Sion (aSi, beP). A nouveau un site de nidification aux environs de 1'000 m sur Niedergesteln (F. Sigg, K. Eigenheer). — **Traquet motteux, Steinschmätzer:** densité de niches exceptionnellement forte dans le val de Moiry, rive droite du lac: env 80 c recensés sur 212 ha donnent une densité moyenne de 0,37 c/ha, entre 2'100 et 2'700 m; la zone la plus riche de ce territoire fournit 23 c pour 24 ha (jcT)! — **Merle, Amsel:** une famille est observée à la limite des derniers sapins, le 10.7 sur Thyon, 2'120 m (Rey) ainsi qu'un m, le 18.6 sur Zermatt, 2'150 m (jS). — Mention spéciale pour la **Grive litorne, Wacholderdrossel** également, dont le nourrissage est observé le 3.7 sur Zermatt, 2'220 m (jS)!

Rousserolle verderolle, Sumpfrohrsänger: présente en plusieurs points de la vallée de Conches (pMo, beP), ainsi qu'à Zinal, entre 1'600 et 1'700 m (jcT). — **Rousserolle turdoïde, Drosselrohrsänger:** retour apprécié d'un ch à Grône (aLu, rIm, iSi), sans toutefois que la nidification puisse être prouvée; l'espèce n'y était plus signalée depuis 1988. Présence presque miraculeuse encore signalée à Leuk (div. obs.). — **Hypolaïs polyglotte, Orpheusspötter:** indices signalés en 10 localités entre Evionnaz et Raron. — **Fauvette orphée, Orpheusgrasmücke:** entendue le 30.6 à Leuk (cB), seul indice. — Bonne prestation d'une **Fauvette babillarde, Klappergrasmücke** observée le 1.7 sur Saint-Luc, 2'400 m (U. Rehsteiner). — **Fauvette grisette, Dorngrasmücke:** 5-6 sites occupés cette année, tous entre Leuk et Gampel. — **Pouillot de Bonelli, Berglaubsänger:** à Zermatt, jusqu'à 2'200 m (jcT). — **Pouillot véloce, Zilpzalp:** entendu en juin sur Zermatt, 2'200 m (jS). — **Pouillot fitis, Fitis:** 2 ch le 31.5 à Vionnaz, sans indice de reproduction (ES). — **Roitelet triple-ban-deau, Sommergoldhähnchen:** noté le 15.6 sur Orsières, 1'600 m (paM)

Des mentions élevées pour le **Gobemouche gris, Grauschnäpper** également: le 19.7, nourrissage sur Gampel, 1'930 m (M. Weggler), présence constatée sur Saxon, 2'100 m, le 18.7 (gCa, gaD, beP) et sur Vernamiège, 1'640 m, le 27.7 (paM).

Loriot, Pirol: toujours réparti en deux pôles de la plaine, aux extrémités du canton.

Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: au min 4 c sur 4 km² dans la région de Collombey-Vionnaz (ES); nourrissage le 28.6 à Bramois (aLu), les seules mentions pour la plaine romande... — **Pie-grièche à tête rousse, Rotkopfwürger:** le dernier couple connu a tenté de nicher à deux reprises à Grimisuat, sans succès visible (beP)!

Chocard, Alpendohle: 2 ind le 15.5 à Leuk, 700 m, dans un biotope favorable (beP). A Sion, 490 m, le couple de l'an passé est à nouveau présent: il couve les 4 et 11.6, mais est absent le 9.7 (aSi). — **Choucas, Dohle:** quelques ind sont présents à Leuk jusqu'au 10.5 (Rey), peut-être ceux de Leukerbad.

Niverolle, Schneefink: entre autres, une 20^e de couples plus ou moins épars ou en colonies lâches sur 4 km dans le val de Moiry, entre 2'250 et 2'700 m (jcT).

Serin, Girlitz: comme chaque année, nicheur à Zermatt, 1'620 m (jS). — **Chardonne-**

ret, Distelfink: 1 ch sur Riederalp, 2'060 m, (W. Leuthold) est probablement un record pour l'espèce. — **Sizerin, Birkenzeisig:** en plaine, vu ou entendu chanter à Fully (beP), Leuk (W. Christen) et Brig-Glis (pMo). — **Beccroisé, Fichtenkreuzschnabel:** une nidification certaine constatée sur Niedergesteln, 1'190 m, le 16.2 (rlm). — **Roselin, Karmingimpel:** signalé en 10 points au moins entre Ritzingen et Biel (pMo, aLu, Zur); la nidification y est cette fois très probable: transport de matériel le 12.6 à Münster (D. Legler).

Bruant jaune, Goldammer: 1 ch en altitude le 29.6 à Gletsch, 1'770 m (E. Baader). — **Bruant zizi, Zaunammer:** en plaine, famille le 30.7 à Collonges et ch passager le 11.4 au pied des Follatères/Fully (beP). — **Bruant ortolan, Ortolan:** le 16.5, 1 ch dans un rideau-abri à Collombey-Muraz, où la reproduction est probable (ES) puis des ch isolés à Orsières le 8.6 et à Sion le 17.6 (paM). Dans le Haut-Valais, noté notamment le 2.7 sur Ausserberg, 2'030 m (U. Rehsteiner). — **Bruant proyer, Grauammer:** noté entre Leuk et Ausserberg, dont 1 ind le 21.5 en ce dernier lieu, à 900 m (P. Tröndle): migrateur attardé?

L'AUTOMNE 1994 HERBST 1994

Fidèle à la saison estivale, août fut sec et chaud. Des périodes de précipitations ont marqué la fin du mois et le milieu de septembre. Octobre fut chaud et sec en général et novembre très humide.

Quelques espèces se sont distinguées par leur **précocité**: des jeunes Grèbes castagneux et huppé, Faucon hobereau et Mésange rémiz ont gagné le Valais à fin juillet et au début d'août déjà. En règle générale, le passage automnal semble avoir été très bon. De **nombreuses espèces** se sont montrées **en abondance** en Suisse tout comme chez nous: **Sarcelle d'été, Traquet pâtre, Pipit rousseline** et **Pie-grièche grise** notamment. Plus spécifique au Valais semble avoir été l'**arrivée massive de Canards siffleurs** en novembre. Le col de **Bretolet** enregistre une **affluence record de Busards des roseaux** et de **Balbuzzards** le 22.9. Signalons enfin quelques données de Limicoles vraisemblablement sans relation, réunies toutefois par leur singulière altitude: Vanneau huppé, Bécassine des marais, Bécassine sourde, Bécasseau variable, Chevalier culblanc et Chevalier sylvain.

Der August war, wie man sich den Sommer vorstellt: warm und trocken. Ende des Monats und Mitte September gab es anhaltende Niederschläge. Der Oktober war im allgemeinen warm und trocken, der November hingegen sehr nass.

Einige Arten erreichten das Wallis sehr frühzeitig. Bereits Ende Juli/Anfang August trafen junge Zwergtaucher, Haubentaucher, Baumfalke und Beutelmeyen bei uns ein. Im allgemeinen scheint der Herbstzug sehr gut gewesen zu sein. Zahlreiche Arten waren bei uns wie auch in der übrigen Schweiz eher überdurchschnittlich häufig: Knäkente,

Schwarzkehlchen, Brachpieper, Raubwürger. Speziell im Wallis gab es im November einen starken Einflug der Pfeifente. Am Col de Bretolet wurde am 22.9. ein **Rekorddurchzug von Rohrweihen und Fischadlern** beobachtet. Zum Schluss seien noch einige Beobachtungen von Limikolen erwähnt, die durch eine besonders grosse Höhenlage auffielen: Kiebitz, Bekassine, Zwergschnepfe, Alpenstrandläufer, Waldwasserläufer und Bruchwasserläufer.

Grèbe castagneux, Zwergtaucher: premiers signes de dispersion juvénile le 21.7 à Martigny (beP). — Même scénario pour le **Grèbe huppé, Haubentaucher**, avec 1 juv du 21.7 au 6.8 à Martigny (beP, cK, Bru). Ensuite, 2 le 28.7 à Collombey-Muraz (paM) puis, en véritable migration, 1 ind le 20.9 à Granges (Rey).

Cormoran, Kormoran: première présence estivale constatée: dès le 28.7, un ind manchot séjourne à Grône (Hau, iSi et al). Les premiers signes de migration sont notés à Grône, avec notamment 11 ind le 3.9 (jcT); suivent 11 ind le 21.9 sur Champéry (P. Bosshard), 49 le 23 au col de Bretolet (Leu) et 9 le 24 au lac de Champex (P. Weber). 9 données d'octobre concernent ensuite 1-3 ind à chaque fois, dont 1 ind le 22.10 à Turtmann et le 23 à Visp (Sal). Novembre annonce des apparitions plus concentrées: 40 ind le 6.11 à Ausserberg (Ker) et 11 du 9 au 16.11 à Grône (Rey, tWy).

Héron cendré, Graureiher: trois groupes de migrateurs sont à relever: 11 ind le 21.9 à Champex, migrent sur le val Ferret (P. Weber) et 8 ind le 29.10 à Raron et le 6.11 à Ausserberg (Ker).

Cigogne noire, Schwarzstorch: 1 juv en escale le 17.8 à Martigny (Bru, beP), puis 1 ind le 16.9 à Gampel (M. Baumann), 4 le 22.9 et 1 le 8.10 sur Champéry (P. Bosshard; F. Kurz). Bon passage.

Canard siffleur, Pfeifente: passage exceptionnel en novembre, laissant plusieurs ind jusqu'à la mi-décembre: le 7.11, arrivée massive de 45 oiseaux à Leuk (Rey) et de 16 à Grône (iSi), où une troupe de 21-4 ind s'attarde jusqu'au 11.12 (iSi, aSi, Rey, rIm, beP). — **Canard chipeau, Schnatterente:** à Grône uniquement, 1 ind du 13 au 17.8 puis 2 du 7 au 10.11 (iSi, Rey). — **Sarcelle d'hiver, Krickente:** première le 19.7 à Grône (Rey) puis le 31 à Martigny (cK); le passage s'étire jusqu'au 22.11 (Rey) au moins, juste après son apogée: max de 30 le 12.11 à Grône (tWy). — **Canard pilet, Spiessente:** 1 le 11.12 à Grône (rIm, beP). — **Sarcelle d'été, Knäkente:** très bon passage automnal avec 2 ind les 30-31.7 à Martigny, 1 le 10.8 à Grône (Bru, beP), 7 le 3.9 à Leuk (rIm) et 1 le 14.9 à Vionnaz (beP). — **Canard souchet, Löffelente:** 2 migrateurs le 22.9 franchissent le col de Bretolet (Leu) et 2 ind le 23.10 à Leuk (beP). — **Nette rousse, Kolbenente:** une nouvelle donnée pour Grône, avec 3-4 ind du 14 au 20.8 (Rey, iSi). — **Fuligule milouin, Tafelente:** 1 m du 17.9 au 4.10 à Leuk puis 2-1 du 12 au 23.11 à Grône (Rey, aSi). — **Fuligule nyroca, Moorente:** long séjour d'un m, ou tentative d'hivernage, à Grône du 21.10 au 23.11 (Rey, gaD, beP, aSi, iSi). — **Fuligule morillon, Reiherente:** déjà le 14.8 à Grône, puis les 7-8 et 22.11 à Leuk (Rey) et 2-1 du 14 au 23.11 à Grône (Rey, aSi). — **Harle bièvre, Gänsesäger:** 2 le 10.9 à Martigny (beP).

Bondrée, Wespenbussard: le 6.9, 43 migrateurs sont comptés en 2h à Niedergesteln et le 25.9, 52 ind au col de Bretolet (rIm); dernière le 9.10 à Vernamiège (aLu). — **Milan noir, Schwarzmilan:** dernier le 24.9 au col de Bretolet (jcT). — **Milan royal, Rotmilan:** 1 le 20.8 à Martigny (jeF) et 10 le 25.9 au col de Bretolet (rIm). — **Gypaète, Bartgeier:** une dizaine d'observations de septembre à novembre, la plupart de sujets indéterminés, dans les régions de Vouvry, Champéry et Fully. République 5 a cependant été reconnu le 12.9 sur Collonges (M. Mottier, G), puis Argentera, du

25 au 27.11 sur Bourg-Saint-Pierre (B. Dorsaz *et al.*, G) et du 29.11 au 3.12 dans la région de Fionnay (rA *et al.*, G). — **Circaète, Schlangennadler**: quelques mentions de migrateurs probables ou d'erratiques automnaux: à début septembre et le 6.10, un oiseau chasse sur les vignes près de Lens (St. Emery), puis 1 ind le 11.9 à Niedergesteln (rlm) et 1 le 12.9 chasse sur le col de Balme (rLu, beP, St. Voisard). — **Busard des roseaux, Rohrweihe**: de forts maxima journaliers au col de Bretolet: 223 le 22.9 (P. Bosshard; record pour l'endroit) et 150 le 23.9 (Leu). Ailleurs, 2 franchissent le col de Balme le 12.9 en 30 minutes (rLu, beP, St. Voisard), 1 le 23.9 au lac de Champex (P. Weber), 1 le 25.9 à Grône (Rey) et 1 m exceptionnellement tardif le 3.12 survole une friche à Granges (paM). — **Busard Saint-Martin, Kornweihe**: principalement à Vouvry, entre le 26.10 et le 13.11 (1-3 ind; beP, rV, tGu, liM), puis 1 le 15.10 au-dessus de Bratsch, 2'390 m, le 21.10 à Erschmatt, 1'550 m (M. Baumann) et le 13.11 à Leuk (rlm). — Un **Busard cendré, Wiesenweihe** les 20 et 21.9 au-dessus de Champéry (P. Bosshard). — **Epervier, Sperber**: max de 20 le 22.9 au col de Bretolet (P. Bosshard). — **Buse, Mäusebussard**: 18 franchissent le col de Chésery, 2'000 m, le 6.10 (rV).

Balbusard, Fischadler: fort passage au col de Bretolet à fin septembre: 29 ind défilent entre le 21 et le 25.9, dont au moins 21 le 22 (Leu); record journalier pour l'endroit!

Faucon crécerelle, Turmfalke: max journalier de 64 le 24.9 au col de Bretolet (jcT). —

Faucon kobez, Rotfussfalke: 1 le 15.9 à Vionnaz (rV). — **Faucon émerillon, Merlin**: 2 premiers le 21.9 à Bretolet (Leu); en plaine, uniquement vu à Collombey-Muraz, les 11 et 22.10 (rV, beP). — **Faucon hobereau, Baumfalke**: hors Chablais, la dispersion juvénile est observée le 31.7 et le 5.8 à Martigny (beP, cK), hors dates normales, puis 2 isolés en migration le 17.9 à Fully (beP); vu également au col de Balme le 12.9 (rLu, beP, St. Voisard).

Gelinotte, Haselhuhn: notons la capture insolite d'un oiseau au col de Bretolet (S)!

Caille, Wachtel: 1 migratrice le 19.9 à Brig-Glis (tWy).

Rôle d'eau, Wasserralle: signalé seulement à Grône et Leuk. — **Rôle des genêts,**

Wachtelkönig: 1 oiseau levé d'une bordure de route le 18.8 à Martigny (beP). —

Marouette ponctuée, Tüpfelsumpfhuhn: 1 juv capturé au col de Bretolet le 30.8 (pMo). — **Foulque, Blässhuhn**: max de 180 le 16.10 à Grône (aLu).

Vanneau, Kiebitz: dispersion en juillet avec 5 ind le 8 et 2 le 13 à Leuk (Rey) et 1 le 13 à Fully (hDu, tGu); à noter en août, 2 ind en vol le 5 sur Zermatt, 2'580 m (M. Julien par jS). Le passage normal est très médiocre et totalise 7 ind à Martigny, 10 à Vouvry et 16 à Leuk (beP, rlm). — **Bécasseau variable, Alpenstrandläufer**: à 1'860 m sur Zermatt, un oiseau se nourrit de vers de terre le 3.10 (jS)! — **Bécassine sourde, Zwergschnepfe**: ici aussi, une mention d'altitude tout à fait inattendue: 1 ind le 2.10 sur Liddes, 2'100 m, levée des myrtilles... (alS, J.-M. Duflon). — **Bécassine des marais, Bekassine**: premier migrateur hâtif, le 15.7 à Sion (phW); passage misérable à Martigny: 4 ind entre le 24.8 et le 13.11 (beP). A noter la découverte d'une plumée au Furkapass, le 24.8 (rlm). — **Bécasse, Waldschnepfe**: levée le 9.10 sur Hérémente, 1'200 m (alS). — **Barge rousse, Pfuhlschnepfe**: nouveauté pour le canton, 1 juv le 17.9 à Vouvry (beP, eRe). — **Chevalier arlequin, Dunkler Wasserläufer**: 1 ind franchit le col de Bretolet le 21.9 (Leu). — **Chevalier aboyeur, Grünschenkel**: 1 juv le 26.9 à Martigny (beP). — **Chevalier culblanc, Waldwasserläufer**: premier le 8.6 à Leuk (U. Kägi), puis entre le 28.7 (Grône, 4 ind; Hau) et le 27.9 (Monthey; rV). Un attardé le 29.10 à Raron (Sal). A noter un oiseau le 6.8 sur Grimentz, 2'760 m (phW). — **Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer**: 4 observations, dont celle du 15.7 à 2'340 m sur Hérémente (jeF). — **Chevalier guignette, Flussuferläufer**: migrateurs signalés dès le 13.7 (Gampel; hDu, tGu); un attardé le 1.10 à Monthey (rV).

- Mouette rieuse, *Lachmöwe***: 9 données entre le 8.7 et le 21.10, de Collonges à Leuk. — **Goéland indéterminé, *unbestimmte Grossmöwe***: 1 ind passe le col de Balme le 12.9 (rLu, beP, St, Voisard). — **Goéland leucophaée, *Weisskopfmöwe***: 1 imm le 4.5 en vol à Grône (J.-P. Reitz), puis un ind en escale le 29.6 au-dessus de Leukerbad, 2'300 m (Gun) et 1 en vol le 19.7 à Martigny (beP).
- Sterne caugek, *Brandseeschwalbe***: 1 ad le 13.9 entre le Bouveret et les Grangettes VD (beP). — **Sterne pierregarin, *Flusseeeschwalbe***: dernière au Bouveret le 14.9 (beP). — **Guifette noire, *Trauerseeschwalbe***: très bon passage à Grône: 1 du 13 au 15.8, suivie de 7 à 3 du 24 au 26.8 et de 3 à 1 les 8 et 10.9 (iSi, Rey); 12 le 17.9 au Bouveret (beP, eRe).
- Pigeon colombin, *Hohлтаube***: vu entre le 3.9 à Collombey-Muraz et le 28.10 à Martigny (beP). — **Tourterelle turque, *Türkentaube***: toujours à Zermatt, 21 ind le 7.10 (jS). — **Tourterelle des bois, *Turteltaube***: dernière le 3.10 à Martigny (beP).
- Chouette de Tengmalm, *Rauhfußkauz***: deux mentions de haute altitude: cris entendus le 1.10 sur Liddes, 2'000 m (alS, J.-M. Duflon) et le 12.10 au-dessus d'Héremence, 2'100 m (alS, aSi).
- Martinet noir, *Mauersegler***: dernier aperçu, le 21.9 à Martigny (beP).
- Martin-pêcheur, *Eisvogel***: 43 données de 10 localités entre fin juillet et mi-novembre; 1 capture au col de Bretolet (S).
- Huppe, *Wiedehopf***: quatre observations, la dernière le 27.8 à Erschmatt, 1'560 m (M. Baumann). A noter tout de même une escale alpine, le 31.7 sur Evolène, 2'020 m (J.-P. Gaillard).
- Pic tridactyle, *Dreizehenspecht***: plusieurs traces sur les aroles dans la région de Riederalp, 2'000 m, le 25.9 (L. Willenegger, J. Gremaud, jeF, beP).
- Alouette lulu, *Heidelerche***: 4 ind le 23.10 à Martigny (Bru, beP). — **Alouette des champs, *Feldlerche***: très fort passage entre le 20 et le 25.10 dans la plaine entre Martigny et Leuk; le plus grand groupe observé est noté le 23.10 à Leuk avec env 500 ind (beP).
- Hirondelle de rivage, *Uferschwalbe***: un erratique ou un ind très hâtif le 13.7 à Grône (hDu, tGu); passage normal dès le 2.8 à Martigny (beP).
- Pipit rousseline, *Brachpieper***: 6 dates entre le 3.9 et le 3.10, dont des groupes de 5 ind le 4.9 à Leuk (rlm) et de 8 ind au moins le 17.9 à Vouvry (beP, eRe). — **Pipit des arbres, *Baumpieper***: un ind très attardé le 23.10 à Martigny (Bru, beP). — **Pipit farlouse, *Wiesenpieper***: 3 premiers le 3.10 à Martigny (beP). — **Pipit à gorge rousse, *Rotkehlpieper***: 3 mentions d'automne, fait très inhabituel pour le Valais: 1 le 23.9 au col de Bretolet (Leu) puis des attardés: 2 le 8.10 et 1 le 12 à Raron (rlm). — Un **Pipit spioncelle, *Wasserpieper*** gagne la plaine de Martigny le 15.9; il neige à 2'000 m (beP). — **Bergeronnette printanière, *Schafstelze***: le passage s'amorce le 11.8 à Martigny (Bru) et s'achève à début octobre; 2 ind très attardés le 13.11 à Leuk (rlm). A noter également la présence de 2 m de la ssp *flavissima* le 14.9 à Martigny (beP; homologués CAVS).
- Rougegorge, *Rotkehlchen***: 1 migrateur en escale surprenante le 5.10 au-dessus de Zermatt, 2'750 m (jS). — **Gorgebleue, *Blaukehlchen***: 2 captures au col de Bretolet (S). — **Traquet tarier, *Braunkehlchen***: en mouvement dès le 30.7 à Dorénaz et derniers le 12.10 à Martigny (beP). — **Traquet pâtre, *Schwarzkehlchen***: en mouvement le 21.7 déjà à Martigny, puis le 30 à Collonges (beP). Le passage automnal fut très fourni, tout comme à l'échelon national: des groupes de 4 à 6 oiseaux ont été constatés plusieurs fois à Leuk et Martigny, où le dernier ind est vu le 25.11 (beP). — **Traquet motteux, *Steinschmätzer***: quasi absent en août, ce n'est qu'en septembre que l'on commence à le trouver en plaine; dernier le 26.10 à Martigny (beP). — **Grive mauvis, *Rotdrossel***: une troupe de 20 ind le 6.10 à Fully (mD) est inhabituelle; suivent 2 isolées, le 12.11 à Grône (aSi) et le 13 à Martigny (beP).

Locustelle tachetée, Feldschwirl: 1 le 23.9 à Martigny, seule donnée (beP). — **Locustelle lusciniôide, Rohrschwirl:** 1 juv capturé au col de Bretolet le 19.8 (P. Fitze). — **Phragmite aquatique, Seggenrohrsänger:** 1 ind le 31.7 dans un champ d'oignons à Martigny (beP; homologué CAVS)! — Deux **Phragmites des joncs, Schilfrohrsänger** dans la région de Martigny-Fully, le 3.9 et les 15-16.9 (beP) et une capture au col de Bretolet (S). — **Rousserolle effarvatte, Teichrohrsänger:** dernière le 16.10 à Grône (aLu). — **Hypolaïs polyglotte, Orpheusspötter:** 1 migrateur le 25.7 dans les mélèzes sur Zermatt, 1'800 m (jS) et 1 le 8.8 à Martigny (beP). — **Fauvette à tête noire, Mönchgrasmücke:** des attardées le 20.11 à Raron (rlm) et le 27 à Vérossaz (M. Défago, par jeF). — **Pouillot siffleur, Waldlaubsänger:** un exceptionnel attardé capturé le 2.10 au col de Bretolet (pMo). — **Pouillot fitis, Fitis:** dernier le 2.10 à Martigny (beP).

Gobemouche gris, Grauschnäpper: derniers le 22.9 à Grône (Rey) et Zermatt (jS). — **Gobemouche noir, Trauerschnäpper:** dernier le 7.10 à Granges (Rey).

Mésange rémiz, Beutelmeise: plusieurs données estivales de juv en dispersion: 3 le 1.8 et cris le 4.9 à Martigny (beP) puis à Grône, 5 à 2 les 10-11.8, 1^{er} et 16.9 (Rey, iSi, Bru, beP). Le passage proprement dit s'étend du 30.9 au 23.10, entre Collombey-Muraz, Martigny et Grône.

Loriot, Pirol: dernier le 13.8 à Turtmann (beP).

Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: passe à Martigny entre le 21.7 et le 5.10 (beP). — **Pie-grièche grise, Raubwürger:** plus de 15 données pour 4 localités: présence réjouissante. Tout d'abord, relevons la capture d'un ad le 23.9 au col de Bretolet (P. Fitze); ensuite, les mentions concernent Ardon, avec le séjour d'un oiseau du 23.10 au 13.12 (gaD, aSi, beP), puis Raron, du 29.10 au 9.12 (Ker, Sal, rlm) et Vionnaz, le 30.10 (rV).

Pie, Elster: 1 ind le 25.9 sur Riederalp, 2'000 m (L. Willenegger, J. Gremaud, jeF, beP). — **Chocard, Alpendohle:** 4 ind en ville de Martigny le 19.9 fuient la neige en altitude (beP). — **Choucas, Dohle:** 4 données, la plus importante concernant 14 ind le 27.9 à Leuk (Rey). — **Grand Corbeau, Kolkrabe:** à noter une capture au col de Bretolet (S).

Pinson du Nord, Bergfink: notamment 80 ind le 13.11 à Leuk (rlm).

Bruant des roseaux, Rohrammer: une 100^e le 26.10 à Vouvy (beP); parmi eux, un ind partiellement albinos, rappelant un Bruant des neiges, est resté jusqu'au 29.10 (tGu, hDu). — **Bruant proyer, Grauammer:** 2 le 13.11 à Steg (rlm).

ESPÈCES EXOTIQUES: ERRATA ET ADDEMDA EXOTISCHE ARTEN: ERRATA UND ADDENDA

Aïx mandarin, Mandarinente: dans le Chablais, 1 f à mi-juin à Collombey-Muraz et le 13.7 à Vionnaz (ES).

La Perruche à collier, Halsbandsittich (Psittacula krameri) niche toujours à Monthey (R. Bérodt); à Sion, le dernier survivant est observé en septembre encore (rLu).

Veuve dominicaine, Dominikanische Witwe (Vidua macroura): 1 m le 6.7 à Sierre (Rey).

Indices de nidification en 1991

— p. 159: **Petit Gravelot, Flussregenpfeifer:** 3 couples (et non 6) cantonnés sur le Rhône à Finges (aLu, rLu).

— ajouter: **Chocard à bec jaune, Alpendohle:** des nids sur des stations de téléphériques au-dessus de Zermatt à 2'580 m, 2'930 m et 3'820 m (jS).

Indices de nidification en 1992

- p. 169: **Faucon crécerelle, Turmfalke**: une famille au Pas de Lona à 2'700 m (rLu) et un nid découvert sur Grimentz à 2'850 m, le plus haut d'Europe (rA).

Le printemps et l'été 1993

- ajouter: **Bécassine sourde, Zwergschnepfe**: 2 ind le 11.3 à Vionnaz (ES).
— ajouter: **Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer**: dernier le 21.5 à Leuk (J. Laesser).
— p. 178: **Sterne caugek, Brandseeschwalbe**: 1 ind pêche toute la journée du 4.7 aux Iles de Sion (Gey).

Indices de nidification en 1993

- ajouter: **Fuligule morillon, Reiherente**: 7 poussins le 3.7 au Bouveret (rhT).
— ajouter: **Râle d'eau, Wasserralle**: 3 couples cantonnés à Vionnaz (ES).

Observations rejetées par la CAVS en 1994

Von der avifaunistischen Kommission abgelehnte Beobachtungen

Aigle criard, Schelladler: 1 ad le 1.10.1989 au col de Bretolet.
Aigle botté, Zwergadler: 1 ind phase sombre le 19.9.1994 sur Champéry
Pic cendré, Grauspecht: 1 f les 27.2, 2./3./5.3.1994 à Saas Almagell.
Cisticole des joncs, Cistensänger: 2 ind le 18.4.1994 à Grône.
Bruant des neiges, Schneeammer: 1 m et 2 f le 13.4.1993 sur Evolène.

Annexe: résultat des recensements OROEM dans le secteur Bouveret—Saint-Gingolph

Anhang: Monatliche Wasservogelzählungen im Sektor Bouveret — St.Gingolph (international bedeutendes Wasservogelgebiet)

	15.10.94	13.11.94
Grèbe castagneux, Zwergtaucher:	13	9
Grèbe huppé, Haubentaucher:	96	91
Grèbe à cou noir, Schwarzhalsstaucher:	—	10
Héron cendré, Graureiher:	2	2
Cygne tuberculé, Höckerschwann:	—	2
Canard colvert, Stockente:	27	61
Fuligule milouin, Tafelente:	7	8
Fuligule morillon, Reiherente:	27	381
Harle bièvre, Gänsesäger:	3	4
Poule d'eau, Teichhuhn:	6	—
Foulque macroule, Blässhuhn:	38	32
Goéland leucopnée, Weisskopfmöwe:	57	10

Bibliographie

- ARLETTAZ, R. 1993. Une aire de Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* à 2'850 m dans les Alpes valaisannes (Suisse). *Alauda* 61: 198-199.
- DIDELOT-VICARI, CL. & TH. SCHMID. 1995. Chronique ornithologique romande: le printemps et la nidification en 1993. *Nos Oiseaux* 43: 33-48.
- MAUMARY, L. & B. VOLET. 1995. Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1993. Rapport de la Commission de l'avifaune suisse (CAvS). *Nos Oiseaux* 43: 95-117.
- POSSE, B. 1994. Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1990-91 à l'automne 1993. *Bull. Murithienne* 112: 151-188.
- SIERRO, A. 1992. Les oiseaux de la réserve de Pouta-Fontana (Grône et Sierre, VS): Situation en 1989 et 1990. *Bull. Murithienne* 110: 3-36.
- SCHMID, H. *et al.* 1994. Service d'information ornithologique. Bulletins 208-211. Station ornithologique suisse.

